

## Betegájékoztató: Információk a felhasználó számára

### Strepsils eperízű cukormentes szopogató tabletták amilmetakrezol, 2,4-diklór-benzil-alkohol

**Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. (Lásd 4. pont.)
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 4-6 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

#### **A betegájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer a Strepsils eperízű cukormentes szopogató tabletták (továbbiakban Strepsils eperízű cukormentes tabletták) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Strepsils eperízű cukormentes tabletták szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Strepsils eperízű cukormentes tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Strepsils eperízű cukormentes tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

#### **1. Milyen típusú gyógyszer a Strepsils eperízű cukormentes tabletták és milyen betegségek esetén alkalmazható?**

Szopogatóra szánt eperízű torokfertőtlenítő gyógyszerkészítmény.

Hatékonyan alkalmazható a torok-, garat-, mandulagyulladás, fogínygyulladás, szájnyálkahártyagyulladás kezelésére, valamint a szájüregben végzett műtétek (mandula, fog, stb.) után a kellemetlen szájíz mérséklésére, ill. a másodlagos fertőzések megakadályozására.

Gyorsan enyhíti a helyi tüneteket, a kínzó torokfájást.

A gyulladás tünetei általában néhány (4-6) napon belül megszűnnek.

Amilmetakrezol és diklór-benzil-alkohol tartalma fertőtlenítő hatású.

A tabletták cukrot nem tartalmaz, ezért cukorbetegség is használhatják.

#### **2. Tudnivalók a Strepsils eperízű cukormentes tabletták szedése előtt**

##### **Ne alkalmazza a Strepsils eperízű cukormentes tablettát:**

Ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6.pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.

A készítmény alkalmazása 4 éves életkor alatt a félrenyelés fokozott veszélye miatt nem javallt.

##### **Figyelmeztetések és óvintézkedések**

A megadott dózist nem szabad túllépni.

Ha a gyógyszer alkalmazásakor néhány napon, maximálisan 1 héten belül a tünetek nem enyhülnek, vagy láz, fejfájás, émelygés, hányás is jelentkezik, egyéb kezelésre van szükség, és orvoshoz kell fordulni.

##### **Egyéb gyógyszerek és a Strepsils eperízű cukormentes tabletták**

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Klinikailag jelentős gyógyszerkölsönhatás nem ismert.

**Terhesség, szoptatás és termékenység**

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Emberekre vonatkozó gyógyszerbiztonsági vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre, ezért a készítmény alkalmazása nem ajánlott orvosi felügyelet nélkül.

**A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

A Strepsils eperízű cukormentes tabletták nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolják a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

**A Strepsils eperízű cukormentes tabletták maltit-szirupot tartalmaznak**

A Strepsils eperízű cukormentes tabletták maltit-szirupot is tartalmaznak. Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdheti szedni ezt a gyógyszert.

**3. Hogyan kell alkalmazni a Strepsils eperízű cukormentes tablettát?**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy a gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja:

A tünetek kezeléséhez a legalacsonyabb hatásos dózist kell alkalmazni a lehető legrövidebb ideig. A gyulladási tünetek általában néhány (4-6) napon belül megszűnnek.

Felnőttek:

1 szopogató tabletták naponta 5 alkalommal 2-3 órás időközönként.

Gyermekek:

5 éves kor feletti gyermekeknek naponta 3-4 tabletták.

4-5 éves korú gyermekeknek naponta 3 tabletták.

4 éves kor alatti gyermekeknek nem adható a félrenyelés fokozott veszélye miatt.

Idősek:

Időskorban nem szükséges a javasolt adagot csökkenteni.

Az alkalmazás módja

Szájnyálkahártyán történő alkalmazásra. A tablettát lassan kell elszopogatni, közvetlenül étkezés után. A táplálkozást, ivást és fogmosást ezután 1-2 órán át kerülni kell.

**Ha az előírtnál több Strepsils eperízű cukormentes tablettát vett be**

A Strepsils eperízű cukormentes tabletták természete és kizserelése miatt véletlen vagy szándékos túladagolás nagyon valószínűtlen.

Esetleges túladagolása a gyomor-bélrendszer diszkomfort-érzését okozhatja.

Ha az előírtnál több Strepsils eperízű cukormentes tablettát vett be, azonnal forduljon orvosához.

**Ha elfelejtette bevenni a Strepsils eperízű cukormentes tablettát**

Ha elfelejtette bevenni a tablettát, vegye be azonnal, amint eszébe jut, kivéve, ha már közeledik a következő adag bevitelének ideje.

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tabletták pótlására, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének teszi ki magát.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

#### 4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Minden gyógyszerrel szemben kialakulhat túlérzékenységi reakció. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben szokatlan tüneteket (pl. duzzanat a test bármely részén, bőrkiütés, hirtelen vérnyomásesés stb.) észlel, a gyógyszer szedését abba kell hagyni, és feltétlenül forduljon kezelőorvosához.

A Strepsils eperízű cukormentes tabletták alkalmazása esetén fellépő mellékhatások az alábbi gyakoriság szerint alakulhatnak ki:

*Nagyon ritka (10 000-ből legfeljebb 1 beteget érinthet):*

- allergiás reakció (bőrirritáció, bőrpír, duzzadás)
- kiütés, kontakt bőrgyulladás, a bőr alatti szövetek duzzanata
- emésztési zavar (gyomorégés a kezelés első napján)

*Nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg):*

- hasi fájdalom, émelygés, szájnyálkahártya-irritáció, a kezelés első két napján a nyelv égő, szúró érzése

#### Mellékhatások bejelentése

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

#### 5. Hogyan kell a Strepsils eperízű cukormentes tablettát tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne alkalmazza. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy sürgősen váltó gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

#### 6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

##### Mit tartalmaz a Strepsils eperízű cukormentes tabletták?

- A készítmény hatóanyagai: Egy szopogató tabletták 0,6 mg amilmetakrezolt, ill. 1,2 mg 2,4-diklór-benzil-alkoholt tartalmaz.
- Egyéb összetevők: szacharin-nátrium, Pink Antho P-WS (E163), eper aroma, borkősav, maltit-szirup, izomalt.

##### Milyen a Strepsils eperízű cukormentes tabletták készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

*Küllem:* Kerek, rózsaszínű, lapos, jellegzetes eperízű, mindkét oldalán Strepsils logóval ellátott szopogató tabletták.

*Csomagolás:* 12 db, ill. 24 db szopogató tabletták fehér átlátszatlan PVC/PVDC/Al buborékcsoomagolásban és dobozban.

**A forgalomba hozatali engedély jogosultja**

Reckitt Benckiser Kft.

1113 Budapest, Bocskai út 134-146., Magyarország

Tel.: +36 1 880 1870

E-mail: [gyogyszer@reckittbenckiser.com](mailto:gyogyszer@reckittbenckiser.com)

**Gyártó:**

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited,

Nottingham Site, Thane Road Nottingham, NG90 2DB, Egyesült Királyság

RB NL Brands B.V.,

Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Hollandia

OGYI-T-4519/03 (12×)

OGYI-T-4519/04 (24×)

**A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2019. március**