

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz paracetamol, gvajfenezin, fenilefrin-hidroklorid

Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz bevétele előtt
3. Hogyan kell szedni a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítményt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítményt tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A WICK TRIACTIN CITROMÍZŰ POR BELSŐLEGES OLDATHOZ ÉS A MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz a megfázás és az influenza tüneteinek enyhítésére szolgál.

Három hatóanyagot tartalmaz:

- A paracetamol jól ismert fájdalomcsillapító. A különböző fájdalmak, így a fejfájás és a torokfájás megszüntetésére és a láz csillapítására alkalmazható.
- A gvajfenezin (köhögéscsillapító) fellazítja a váladékot és enyhíti a hurutos köhögést.
- A fenilefrin-hidroklorid (orrdugulás elleni szer) csökkenti az orrjárat duzzanatát, így enyhíti az orrdugulást.

Csak akkor alkalmazza a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítményt, ha fájdalmai/vagy láza, orrdugulása és hurutos köhögése van.

2. TUDNIVALÓK A WICK TRIACTIN CITROMÍZŰ POR BELSŐLEGES OLDATHOZ BEVÉTELE ELŐTT

Ne szedje a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítményt:

- ha allergiás (túlérzékeny) a paracetamolra, gvajfenezinre, fenilefrin-hidrokloridra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére
- ha szívbetegségben szenved
- ha magas a vérnyomása (esszenciális hipertónia)
- ha májproblémája van, vagy súlyos vesebetegségben szenved
- ha pajzsmirigy-túlműködésben szenved
- ha cukorbeteg

- ha zárt zugú zöld hályogban szenved (a szem belső nyomása megemelkedett)
- ha porfíriában szenved, amely egy olyan örökletes betegség, amelyre jellemző a vizeletben nagy mennyiségben jelen lévő pigmentek
- ha triciklusos antidepresszánsokat szed
- ha béta-blokkolókat szed
- ha monoaminooxidáz-gátlókat (MAOI-kat) szed a depresszió vagy Parkinson-kór kezelésére, vagy az elmúlt 14 napban ilyet szedett
- ha a vérnyomás csökkentésére vagy a mellkasi fájdalom (angina) kezelésére szed gyógyszereket.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Fontos: Paracetamol-t tartalmaz.

Ne szedje együtt más paracetamol-tartalmú készítménnyel.

Túladagolás esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, akkor is, ha jól érzi magát, a késleltetett, súlyos májkárosodás kockázata miatt.

Ne szedje együtt más influenza, meghűlés vagy orrdugulás elleni készítménnyel.

Kérdezze meg kezelőorvosát a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítmény alkalmazása előtt:

- ha problémája van a májműködésével
- ha Ön férfi és prosztata-megnagyobbodásban szenved, mert ilyen esetben a vizelési nehézségei súlyosbodhatnak
- ha vérkeringési problémája van (például Raynaud-szindrómás)
- ha visszatérő vagy hosszú ideje fennálló (krónikus) köhögéstől szenved, amit dohányzás, asztma, krónikus légcsőhurut (bronhitisz) vagy tüdőtágulat (emfizéma) okoz.
- ha súlyos vérszegénységben (hemolitikus anémiában), glükóz-6-dehidrogenáz-hiányban, krónikus táplálkozási rendellenességben szenved vagy csökkent szervezete folyadék-tartalma (dehidrált).

Gyermekek és serdülők

Ne adjon Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítményt 12 éves életkor alatti gyermekeknek.

Egyéb gyógyszerek és a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítmény szedése előtt, ha az alábbiakat szedi:

- **paracetamol-t vagy más orrdugulás elleni szert** tartalmazó gyógyszer a **meghűlés és influenza kezelésére**.
Ha ezeket szedi, akkor ne vegye be a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítményt.
- **monoaminooxidáz-gátlók (MAO-gátlók)** a **depresszió**, illetve a Parkinson-kór kezelésére. **Ne szedje a** Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítményt, ha az elmúlt 14 napban MAO-gátlókat szedett.
- **triciklusos antidepresszánsok** a **depresszió** kezelésére, például amitriptilin vagy imipramin.
- **vérnyomáscsökkentő gyógyszerek**, így például béta-blokkolók, valamint a szív működését javító, illetve a szabálytalan szívverést korrigáló gyógyszerek (digoxin, lanoxin, digitoxin)
- fenotiazinok (ezeket antipszichotikus gyógyszerként alkalmazzák olyan betegségek kezelésére, mint például a skizofrénia vagy a paranoia, illetve a hányinger és a hányás megelőzésére).
- **hányinger- és hányáscsillapító** gyógyszer (például metoklopramid vagy domperidon)
- **vérhígító gyógyszerek** (véralvadásgátlók), mint például warfarin vagy egyéb kumarin-származékok
- **koleszterinszint-csökkentők** (például kolesztiramin)
- nyugtatók (barbiturátok)
- probenecid vagy AZT (zidovudin)

- izoniazid (a tuberkulózis kezelésére és megelőzésére szolgáló gyógyszer).

A Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz egyidejű bevétele étellel és itallal

A készítményt nem szabad alkoholos italokkal bevenni.

Terhesség, szoptatás és termékenység

A Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz alkalmazása nem javasolt terhesség és szoptatás idején: alkalmazás előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítmény szédülést vagy zavartságot okozhat. Ha ez előfordul, akkor ne vezessen, illetve ne kezeljen gépeket.

A Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítmény tartalmaz:

- Aszpartámot (E591), mely egy fenilalanin-forrás. Fenilketonúriás személyek számára káros lehet.
- Szacharózt. Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.
- Nátriumot (adagonként 157 mg), amit kontrollált nátriumdiétát tartó betegek esetén figyelembe kell venni.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A WICK TRIACTIN CITROMÍZŰ POR BELSŐLEGES OLDATHOZ KÉSZÍTMÉNYT?

A gyógyszert mindig a kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja:

Felnőttek és 12 év feletti gyerekek:

Szükség szerint 4-6 óránként 1 tasak. 24 órán belül 4 tasaknál többet nem szabad elfogyasztani.

Ne lépje túl a megadott adagot.

A készítményt nem szabad alkoholos italokkal bevenni.

Alkalmazása gyermekeknél és serdülőknél

12 évesnél fiatalabb gyermekeknek nem adható.

Az alkalmazás módja

Ez a gyógyszer egy vízben oldódó por, amelyet forró italként fogyasztunk.

Egy tasak tartalmát oldja fel egy normál bögre forró, de nem forrásban lévő vízben (kb. 250 ml).

Hagyja iható hőmérsékletre lehűlni, és igya meg a sárga, opálos oldatot jellegzetes citrus/mentolos illattal és ízzel.

A kezelés időtartama

A készítmény hosszú távú alkalmazása nem javasolt.

Ha tünetei több mint 3 napig fennmaradnak, vagy rosszabbodnak, forduljon orvosához.

Ha az előírtnál több Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítményt vett be

Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha véletlenül az előírtnál többet vett be, vagy a javasoltnál többet adott be egy gyereknek, akkor is, ha Ön/a gyermek jól érzi magát, a késleltetett, súlyos májkárosodás kockázata miatt.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Ha az alábbi súlyos mellékhatások bármelyikét észleli, azonnal hagyja abba a gyógyszer szedését, és sürgősen forduljon orvoshoz.

- Nagyon ritkán súlyos bőrreakciókról számoltak be. Ritkán súlyos allergiás reakciók (anafilaxiás sokk); asztmás légzés, illetve légzési nehézségek is előfordulhatnak.
(Ritka: 1000 beteg közül 1-nél kevesebbet, de 10 000 beteg közül 1-nél többet érint; nagyon ritka: 10 000-ból legfeljebb 1 beteget érint)
- A paracetamollal összefüggésben nagyon ritkán (10 000 ember közül legfeljebb 1 beteget érint) előfordulhatnak bizonyos vérsajt-rendellenességek és hasnyálmirigy-gyulladás.

Egyéb mellékhatások

Gyakoriság	Mellékhatás
Gyakori (10 beteg közül 1-nél kevesebbet, de 100 beteg közül 1-nél többet érint).	Étvágytalanság, hányinger, illetve hányás
Ritka (1000 beteg közül 1-nél kevesebbet, de 10 000 beteg közül 1-nél többet érint).	Allergiás reakciók (például bőrkiütés vagy csalánkiütés) Gyomorfájás, hasmenés Fejfájás, szédülés Heves szívdobogás (palpitáció), magas vérnyomás Alvászavar (álmatlanság), idegesség, remegés (tremor), ingerlékenység, nyugtalanság, zavartság szorongás.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. HOGYAN KELL A WICK TRIACTIN CITROMÍZŰ POR BELSŐLEGES OLDATHOZ KÉSZÍTMÉNYT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A tasakon vagy a dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne szedje a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítményt. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Eltarthatóság feloldás után: Az elkészített oldat 90 percig stabil.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz?

A gyógyszerből egy tasak egy adagot tartalmaz az alábbi **hatóanyagokkal**: 500 mg paracetamol, 200 mg gvajfenezin és 10 mg fenilefrin-hidroklorid.

Egyéb összetevők: szacharóz, citromsav, borkósav, nátrium-ciklamát, nátrium-citrát, aszpartám (E951), aceszulfám-kálium (E950), porított mentol aroma, citrom aromák, citromlé aroma, kinolinsárga (E104). Lásd a 2. pont végét.

Milyen a Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

A Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz laminált tasakokba és dobozba csomagolt fehér por. A készítmény 5 és 10 db tasakot tartalmazó dobozban kerül forgalomba.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja

Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH,
Sulzbacher Str. 40-50,
D-65824 Schwalbach am Taunus,
Németország

Gyártó

Wrafton Laboratories Limited
Braunton,
Devon,
EX33 2DL
Nagy-Britannia

vagy

Procter & Gamble Manufacturing GmbH
Procter & Gamble Strasse 1
64521 Gross-Gerau, Hessen
Németország

OGYI-T-21591/01 5 db
OGYI-T-21591/02 10 db

Ezt a gyógyszert az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban az alábbi neveken engedélyezték

Ausztria	WICK Kombi Erkältungstränk Pulverzur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Cseh Köztársaság	Vicks TriActin Complete citrón
Egyesült Királyság	Vicks Cold & Flu Care Daymed Plus Hot Drink
Lengyelország	Vicks TriActin Complete Cytrynowy
Magyarország	Wick TriActin Citrom ízű por belsőleges oldathoz
Németország	WICK Kombi Erkältungstränk
Olaszország	Vicks Influenza e Raffreddore
Spanyolország	ResfriVicks

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2019. március.